

na očkování, informujte o tom očkující personál. Očkování není vhodné ani v situaci, kdy má Vaše dítě probíhající akutní horečnaté onemocnění nebo probíhající COVID19.

JAK SE VAKCÍNA COMIRNATY PODÁVÁ?

Vakcína bude dítěti aplikována injekčně do svalu na rameni. Nejdříve 21-42 dní po první dávce je potřeba podat druhou dávku. Vakcína není t.č. zaměnitelná za jinou očkovací látku proti nemoci COVID-19 od jiného výrobce. Při očkování druhé dávky byste u sebe měli mít záznam o předchozí aplikaci první dávky.

JAKÝ MŮŽE MÍT VAŠE DÍTĚ Z OČKOVÁNÍ PROSPĚCH?

V klinických studiích byla zjištěna vysoká účinnost (92-100 %) 7 dní po aplikaci 2. dávky vakcíny v prevenci onemocnění COVID-19. Očkování ale neposkytuje všem očkovaným osobám záruku ochrany. Doba trvání ochrany v současnosti není známa. Po aplikaci 1. dávky vakcíny nejste plně chráněni a je třeba dodržovat běžné zásady prevence a ochrany proti nemoci COVID19.

JAKÁ S SEBOU NESE OČKOVÁNÍ RIZIKA?

Během klinických studií byly zjištěny tyto nežádoucí účinky: bolest a svědění v místě aplikace injekce, únava, bolest hlavy, bolesti svalů a zimnice, bolesti kloubů, horečka azduření v místě injekce, zvětšení mízních uzlin. Vyskytovala se nevolnost, nespavost, malátnost či periferní obrna lícního nervu. Tyto nežádoucí účinky byly zpravidla mírné nebo střední intenzity a odezněly během několika dní po vakcinaci. Prosíme, konzultujte tyto nežádoucí účinky se svým registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost. Někteří lidé mohou vzácně mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se nejčastěji projevuje jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře nebo v mimopracovní dny navštivte pohotovostní lékařskou službu. V případě ohrožení života a zdraví volejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.

JAK SNÍŽIT RIZIKO ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH REAKCÍ?

Po každém očkování je vyžadováno vyčkání ve zdravotnickém zařízení 15 minut po vakcinaci. V následných dnech po očkování se doporučuje dodržovat alespoň další 3 dny šetřící režim. Není doporučena nadměrná fyzická zátěž, koupání se v horké vodě ani saunování. V případě rozvoje závažných potíží mimo zdravotnické zařízení volejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.

O provedeném očkování informujte praktického lékaře Vašeho dítěte!

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

Pročetl/a jsem, porozuměl/a jsem textu a měl/a jsem možnost klást dotazy. Prohlašuji, že nevím o žádném důvodu, který by mému dítěti bránil v aplikaci této očkovací látky a všechny mnou zadané údaje jsou pravdivé. Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s možnými vedlejšími účinky. Těmito informacím rozumím a nemám žádné otázky ani nejasnosti. Byl/a jsem poučen/a o způsobu aplikace vakcíny a povakcinačním režimu. **Souhlasím s aplikací očkovací látky proti onemocnění COVID-19 svému dítěti.**

Datum: Podpis zákonného zástupce očkovaného:

Datum: Podpis očkujícího zdravotníka: