

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM NOVÝ JIČÍN

P – CC/TH/2012

LÉČEBNÝ ALGORITMUS: KARCINOM TLUSTÉHO STŘEVA

A HORNÍ TŘETINY REKTA

(C18.0-C18.9, C20)

Diagnostický algoritmus vychází z kolonoskopického nálezu a stagingu (tumor > 12cm od análního okraje):

- 1. cTxNxM0 (operabilní)**
 - 1.1. radikální resekce (kompletní elize mesokolon), včetně multivicerální resekce

- 2. cT4bNxM0**
 - 2.1. dle symptomatologie a lokalizace - operace (bypass, stomie), event. kolorektální stent
 - 2.2. paliativní CHT
 - 2.3. symptomatická terapie

- 3. cTxNxM1a(hepar)**
 - 3.1. operace
 - 3.1.1. radikální resekce rekta – následně
 - 3.1.1.1. resekce jaterních MTS
 - 3.1.1.2. systémová terapie – následně restaging ad operace MTS (event. ablace,) ad paliativní CHT ± biologická th. ad 3.3.
 - 3.1.2. paliativní resekce/bypass/stomie ± paliativní CHT
 - 3.1.3. „Liver first“ resekce – následně ad 1.1.
 - 3.2. iniciální systémová terapie – následně restaging ad 3.1. ad 3.3. ad paliativní CHT ± biologická th.
 - 3.3. symptomatická terapie

- 4. cTxNxM1b**
 - 4.1. operace
 - 4.1.1. radikální resekce – následně
 - 4.1.1.1. resekce MTS (hepar, pulmo,...)
 - 4.1.1.2. systémová terapie – následně restaging ad operace MTS (event. ablace,) ad paliativní CHT ± biologická th.
 - 4.1.2. paliativní resekce/bypass/stomie ± paliativní CHT
 - 4.2. iniciální systémová terapie – následně restaging

- ad 4.1.
- ad 4.3.
- ad paliativní CHT ± biologická th.
- 4.3. symptomatická terapie

Terapeutický plán je stanoven doporučením multidisciplinární onkologické komise. Jeho změna na kterémkoliv stupni by měla být vázaná na opakovanou referenci případu v rámci multidisciplinární komise.